Red de Aprendizaje para la Respuesta a la COVID-19 en América Latina

GUÍA PRÁCTICA PARA LA TERAPIA CON OXÍGENO PREVIO A LA INTUBACIÓN EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON NEUMONÍA COVID-19

Miércoles, 3 de Febrero, 2021

USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Acerca de la Red de Aprendizaje y Nuestros Aliados Estratégicos

- Proyecto EpiC
- Proyecto STAR
- Open Critical Care (opencriticalcare.org)
- HP+

Red de Aprendizaje

Para la Respuesta COVID-19 en América Latina

¿Cómo Mejorar la Prevención y Control de Infecciones en Nuestros Hospitales?

Miércoles 20 de enero, 2021: 8pm (Washington D.C) | 7pm (Honduras) | 9pm (Paraguay)

Regístrese aquí:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/7836145016536229648>

Guía Práctica Para la Terapia con Oxígeno Previo a la Intubación en Pacientes Diagnosticados con Neumonía COVID-19

Miércoles 3 de febrero, 2021: 8pm (Washington D.C) | 7pm (Honduras) | 9pm (Paraguay)

Regístrese aquí:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/362955797641985040>

Guía Práctica Para Ventilación Mecánica en Pacientes Diagnosticados con Neumonía COVID-19

Miércoles 17 de febrero, 2021: 8pm (Washington D.C) | 7pm (Honduras) | 9pm (Paraguay)

Regístrese aquí:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/1505537494901499152>

Actualización sobre las Guías Terapéuticas COVID-19 para Obtener Óptimos Resultados

Miércoles 3 de marzo, 2021: 8pm (Washington D.C) | 7pm (Honduras) | 9pm (Paraguay)

Regístrese aquí:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/6228303874548410896>

Enfermería en Cuidados Críticos: Elementos Fundamentales en el Cuidado de Pacientes COVID-19

Miércoles 17 de marzo, 2021: 8pm (Washington D.C) | 7pm (Honduras) | 9pm (Paraguay)

Regístrese aquí:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/3650872697196753675>

¿Cómo Mejorar la Salud Mental de Pacientes en Cuidados Críticos?

Miércoles 31 de marzo, 2021: 8pm (Washington D.C) | 7pm (Honduras) | 9pm (Paraguay)

Regístrese aquí:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/7360021297429412107>

The hub for critical care education materials

This site (currently in beta) aims to help healthcare workers in resource-variable settings find open-access, high-quality critical care learning resources. We are starting with respiratory care!

[Visit our Resource Library](#)

[View our Suggested COVID Trainings](#)

OPEN PEDIATRICS

Open Critical Care

<https://opencriticalcare.org>

Navegación de la Plataforma GoToWebinar

Recuerda

- Mantener el micrófono en silencio, excepto en la sección de preguntas y respuestas en donde podrás solicitar participación levantando la mano.
- A lo largo de la presentación haremos preguntas, por lo que te invitamos a participar en tiempo real.
- Tendremos secciones para preguntas y respuestas.
- Te motivamos a hacer tus consultas en la casilla de preguntas.
- Al final, favor completar la encuesta de satisfacción de retroalimentación.

RED DE APRENDIZAJE

Para la Respuesta a la COVID-19 en América Latina

Guías Prácticas para la Terapia con Oxígeno Previo a la Intubación en Pacientes Diagnosticados con Neumonía por COVID-19

Miércoles, 3 de Febrero, 2021

8pm (Washington D.C.) | 7pm (Honduras) | 9pm (Paraguay)

Pre-Test

- Si no ha contestado el pre-test que enviamos por correo electrónico, por favor escanee el código o utilice el enlace a mano derecha
 - Le tomará de 3-5 minutos.

<https://bit.ly/3plazII>

Conferencistas

Dr. William Checkley, MD, PhD

Estados Unidos

Especialista en Neumología y
Cuidados Críticos

Docente, Universidad Johns
Hopkins

Dr. Judy Enamorado, MD

Honduras

Especialista en Cuidados
Críticos del Adulto

IHSS

Objetivos

1. Presentar **recomendaciones prácticas** para el uso de oxígeno suplementario de baja y alta presión.
2. Proveer recomendaciones sobre el **posicionamiento prono en pacientes no intubados**.
3. Compartir las herramientas disponibles en la página de **Open Critical Care**.

Agenda

1. Introducción a Escenario Clínico
2. Recomendaciones Generales
3. Conclusión de Escenario Clínico Parte 1
4. Sistemas de Oxigenación
5. Conclusión de Escenario Clínico Parte 2
6. Recursos Disponibles (Terapia Respiratoria)
7. Preguntas y Respuestas

Introducción: Escenario Clínico

COVID-19: Escenario Clínico

Instituto Hondureño de Seguridad Social

- ✓ Masculino 38 años.
- ✓ Procedente de Tegucigalpa.
- ✓ Casado. 3 hijos.
- ✓ Niega hábitos tóxicos.

COVID-19: Antecedentes

Antecedentes Patológicos	Antecedentes Epidemiológicos	Antecedentes Familiares
<ul style="list-style-type: none">• HTA hace 5 años. ✓ Irbesartán 300 mg al día	<ul style="list-style-type: none">• Perito mercantil y contador público.	<ul style="list-style-type: none">• Madre: HTA, cardiopatía isquémica.
<ul style="list-style-type: none">• DM-2 hace 2 años. ✓ Metformina 850 mg BiD.	<ul style="list-style-type: none">• Trabaja en un centro comercial.	<ul style="list-style-type: none">• Padre: cáncer de próstata.
<ul style="list-style-type: none">• Obesidad grado III. 130 Kg.	<ul style="list-style-type: none">• Niega viajes fuera de la ciudad en los últimos seis meses o contacto con animales.	

COVID-19: Escenario Clínico

Historia de la enfermedad actual:

Fiebre subjetivamente alta no cuantificada, mialgias, anosmia y ageusia de 7 días de evolución, en los últimos 3 días tos seca. Niega disnea o dolor torácico.

COVID-19: Escenario Clínico. Día 1.

Examen físico:

38 C

Temperatura

24 X

Frecuencia
Respiratoria

140/80

Presión
Arterial

91%

SO₂,
FiO₂ 21%

100 X

Frecuencia
Cardiaca

COVID-19: Exámenes de Laboratorio. Día 1.

Hemograma	Leuc: 5,000/mm ³	Neut: 2,500/mm ³	Linf: 1,900/mm ³	Hb: 15.5 g/dL	HTO: 46.2%	Plaq: 190,000/mm ³
Química Sanguínea	Creat: 0.9 mg/dL (0.7-1.2 mg/dL)	IL-6: 38 pg/ml (1.50-7 pg/ml)	PCR: 59 mg/L (1-5 mg/L)	Ferritina: 545 ng/ml (0-500 ng/ml)	Dímero D: 0.38 mcg/ml (< 0.5 mcg/ml)	Procalcitonina: negativa
Gasometría Arterial	pH 7.42 (7.35-7.45)	paCO ₂ 35 mm Hg (35-45 mm Hg)	paO₂ 60 mm Hg (80-100 mm Hg)	SO₂ 91%	HCO ₃ 26 mmol/L	Ebases: 4 mmol/L
rT PCR SARS COV-2	POSITIVO					

PaO₂/FiO₂
285 mm Hg

ROX: 17

{SaO₂/FiO₂}/
FR > 4.8

COVID-19: Estudios de imagen. Día 1.

RX de Tórax

- Infiltrados basales bilaterales

COVID-19: Estudios de imagen. Día 1.

TAC de Tórax

- Opacidades periféricas basales bilaterales con patrón en vidrio deslustrado.

¿Qué Harías?

- A. Oxígeno en mascarilla con reservorio
- B. Ventilación mecánica no invasiva
- C. Oxígeno en alto flujo
- D. Ventilación mecánica invasiva
- E. Oxígeno en puntas nasales

Recomendaciones Generales

Recomendaciones para el Uso del Oxígeno Suplementario

- En pacientes hipoxémicos con COVID-19, **sugerimos** oxígeno suplementario para un $SpO_2 < 94\%$ (sin hipercapnia) o $SpO_2 < 92\%$ (con hipercapnia).
- En pacientes hipoxémicos con COVID-19, **recomendamos** oxígeno suplementario para mantener la SpO_2 entre 88% y 95%.
- En pacientes hipoxémicos con COVID-19, **sugerimos** objetivos más altos para SpO_2 en entornos donde la pulso oximetría continua no está disponible (SpO_2 del 95% al 97%).

Recomendaciones para el Uso del Oxígeno Suplementario

- En pacientes hipoxémicos con COVID-19, **recomendamos** el uso de sistemas de oxígeno de bajo flujo para oxígeno suplementario.
- En pacientes con COVID-19 que permanecen hipoxémicos a pesar de oxigenoterapia de bajo flujo, **sugerimos** oxígeno nasal de alto flujo o ventilación no invasiva (requiere monitoreo continuo y aislamiento).
- En pacientes con COVID-19, **sugerimos** control de fiebre con paracetamol, uso de antitusígenos para tos severa y sedación leve.

Recomendaciones para el Uso del Oxígeno Suplementario

- En pacientes con COVID-19 no-intubados que permanecen hipoxémicos a pesar del uso de oxígeno nasal de bajo flujo, oxígeno nasal de alto flujo o ventilación no invasiva, y que no muestran signos claros de dificultad respiratoria, **sugerimos** probar posicionamiento prono.
- Sin embargo, esto requiere un monitoreo cercano y de criterios claros de falla y/o necesidad de escalamiento de terapia.

Recomendaciones para el Uso del Oxígeno Suplementario

- En pacientes con COVID-19 no-intubados que permanecen hipoxémicos a pesar de oxigenoterapia de bajo flujo, **sugerimos** oxígeno nasal de flujo alto o ventilación no invasiva (requiere monitoreo continuo y aislamiento).
- En pacientes con COVID-19 no-intubados que permanecen hipoxémicos a pesar del uso oxígeno nasal de alto flujo o ventilación no invasiva, y que no muestran signos de dificultad respiratoria, **sugerimos** combinar con posicionamiento prono.

Recomendaciones para Terapias no Invasivas Previa a la Intubación y Ventilación Mecánica

- **Sugerimos** el uso de cuartos de aislamiento y salas con presión negativa para pacientes que están bajo tratamiento con oxígeno nasal de alto flujo o ventilación no invasiva.
- **Recomendamos** el uso de mascarillas quirúrgicas por encima de la cánula nasal de alto flujo o máscara de ventilación no invasiva.

Conclusión de Escenario Clínico Parte 1

COVID-19: Evolución – Día 1.

- Se inicia tratamiento con O₂ suplementario en puntas nasales a 5 lpm
 - ✓ SO₂ a 96% FR 20 X.
- Se administra tratamiento con esteroides, anticoagulación, antiinflamatorios.

COVID-19: Evolución – Día 3.

- Deterioro clínico progresivo en las siguientes 48 hrs con aumento del trabajo respiratorio e hipoxemia.
- Se administra O₂ en mascarilla con reservorio a 15 lpm.

COVID-19: Escenario Clínico. Día 3.

Examen físico:

37 C Temperatura

29 X Frecuencia Respiratoria

160/90 Presión Arterial

88% SO_2 ,
FiO₂ 80%

110 X Frecuencia Cardíaca

COVID-19: Exámenes de Laboratorio. Día 3.

Hemograma	Leuc: 12,5000/mm ³	Neut: 10,420/mm ³	Linf: 900/mm ³	Hb: 14 g/dL	HTO: 42%	Plaq: 250,000/mm ³
Química Sanguínea	Creat: 1.1 mg/dL (0.7-1.2 mg/dL)	IL-6: 550 pg/ml (1.50-7 pg/ml)	PCR: 192 mg/L (1-5 mg/L)	Ferritina: 1250 ng/ml (0-500 ng/ml)	Dímero D: 1.5 mcg/ml (<0.5 mcg/ml)	Procalcitonina: negativa
Gasometría Arterial	pH 7.54 (7.35-7.45)	paCO ₂ 30 mm Hg (35-45 mm Hg)	paO₂ 56 mm Hg (80-100 mm Hg)	SO₂ 88%	HCO ₃ 30 mmol/L	Ebases: 6 mmol/L
rT PCR SARS COV-2	POSITIVO					

**PaO₂/FiO₂
70 mm Hg**

ROX: 3.8

**{SaO₂/FiO₂}/
FR > 4.8**

COVID-19: Estudios de imagen. Día 3.

RX de Tórax

- **Progresión de los infiltrados basales bilaterales de predominio izquierdo**

COVID-19: Estudios de imagen. Día 3.

TAC de Tórax

- Progresión de las opacidades periféricas bilaterales con patrón en vidrio deslustrado.
- Condensaciones basales.

¿Qué Harías?

- A. Oxígeno en mascarilla con reservorio
- B. Ventilación mecánica no invasiva
- C. Oxígeno en alto flujo
- D. Ventilación mecánica invasiva
- E. Oxígeno en puntas nasales

Sistemas de Oxigenación

Sistemas de Baja Presión de Oxígeno

Cánula nasal

- Suministro máximo:
 $FiO_2 \sim 40\%$
- 1 - 6 L/min
- Oxigenoterapia para COVID-19 leve/moderado

Máscara

- Suministro máximo:
 $FiO_2 \sim 50\%$
- 1- 10 L/min
- Oxigenoterapia para COVID-19 leve/moderado

Máscara Venturi

- Suministro máximo:
 $FiO_2 \sim 60\%$
- 0 - 15 L/min
- Mezcla aire ambiental con oxígeno al 100%

Máscara sin reinhalación

- Suministro máximo:
 $FiO_2 > 85\%$
- Puede utilizar mucho flujo > 10-15 L/min

Uso de Oxígeno Suplementario

- Usar flujo de oxígeno suplementario más bajo posible para ayudar a priorizar el flujo de oxígeno a los pacientes más gravemente enfermos.
- Ventilación no invasiva (NIV) generan aerosoles y deben usarse en combinación con una máscara quirúrgica o, preferiblemente, en una sala de aislamiento.

Interfaces para el Suministro de Oxígeno: Máscara Sin Re-inhalación

- Una máscara sin re-inhalación es una interfaz segura en la terapia de oxígeno suplementario en pacientes con COVID-19.
- Estas máscaras ayudan a limitar la dispersión de gotículas.
- Distancia máxima de dispersión exhalada a 10 L/min es <10 cm.
- Puede alcanzar una $FiO_2 >0.85$ a flujos cercanos a 15 L/min.

Interfaces para el Suministro de Oxígeno:

Máscara Sin Re-inhalación

- Para prevenir hipercapnia, la bolsa reservorio debe permanecer inflada en todo momento.
- Esto requiere velocidades de flujo de al menos 8-10 L/min.
- El uso de máscaras sin re-inhalación generalmente requiere oxígeno a través de un sistema de tuberías dentro del hospital.

Sistemas de Alta Presión de Oxígeno

Cánula nasal de alto flujo

- FiO_2 0.21 – 1
- Flujo 20 – 70 L/min
- Requiere calor activo y humidificación
- Bien tolerado

Ventilación no invasiva

- Diferentes tipos de máscaras
- FiO_2 0.21 – 1
- Flujo 10 – 60 L/min
- Proporciona presión positiva
- Tolerancia limitada a largo plazo
- Requiere un estado mental adecuado
- Impacto en los resultados en COVID-19 es incierto

Ventiladores

Interfaces para el Suministro de Oxígeno: Cánula nasal de alto flujo

- Suministro de oxígeno por la nariz.
- Puede suministrar $FiO_2 = 1$ a 20-70 L/minuto.
- Requiere calentamiento y humidificación del aire para evitar que las vías respiratorias se sequen.
- Bien tolerado y puede ayudar a prevenir ventilación mecánica invasiva en pacientes con COVID-19.

Cánula Nasal de Alto Flujo

- El oxígeno a alto flujo genera bajos niveles de presión positiva en las vías respiratorias superiores.
- Disminuye el espacio muerto fisiológico eliminando el dióxido de carbono espirado de las vías respiratorias superiores.
- Puede explicar la disminución observada en el trabajo respiratorio.
- Utiliza una gran cantidad de oxígeno debido a los altos flujos.

Cánula Nasal de Alto Flujo

Meta-análisis

- 9 ensayos aleatorios, 2093 pacientes.
- En pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, la HFNC puede disminuir la necesidad de intubación traqueal sin afectar la mortalidad comparado con terapia de oxígeno convencional.
- Disminución del riesgo de requerir intubación (RR=0.85; 95% CI 0.74-0.99) favoreciendo HFNC.
- No hubo diferencia en mortalidad (RR=0.94, 95% CI 0.67–1.30).

Cánula Nasal de Alto Flujo

- En entornos donde el suministro de O_2 es limitado, la cánula nasal de alto flujo debe usarse con mucho cuidado ya que requiere de alto uso de O_2 .
- Combinar con posicionamiento prono en pacientes despiertos que permanecen hipoxémicos.

Ventilación no Invasiva (CPAP/BiPAP)

- **Varias interfaces:**
Suministro de oxígeno por máscara completa, oral o nasal o por casco.
- FiO_2 hasta 1 con flujos ~ 10-60 L/minuto según el sello.
- Proporciona presión además de oxígeno.
- Requiere un estado mental adecuado.

CPAP: Continuous Positive Airway Pressure

- Dispositivo o modo que aplica presión constante durante inspiración y espiración.
- La presión ayuda abrir las vías aéreas superiores a reclutar unidades pulmonares colapsadas para ayudar con oxigenación.
- No reduce el esfuerzo inspiratorio y no puede proporcionar un apoyo respiratorio completo.

BiPAP: Bi-level Positive Airway Pressure

- **Nombre común:** Ventilación no-invasiva con presión positiva
- Dispositivo o modo que aplica presión durante inspiración > presión durante espiración.
- Reduce el esfuerzo respiratorio y técnicamente puede proporcionar un soporte respiratorio completo.

Ventilación no Invasiva (CPAP/BiPAP)

Uso de CPAP/BiPAP para la COVID-19

- No existe evidencia sólida a favor o en contra de su uso en COVID-19.
- Puede aumentar la lesión pulmonar y mortalidad.
- Riesgo de aerosolización (datos limitados durante SARS).
- Algunos consideran que COVID-19 es una contraindicación para su uso, especialmente relevante cuando hay falta de EPP y salas de aislamiento.

Recomendaciones para Minimizar la Propagación Nosocomial (CPAP/BiPAP)

- Sala de presión negativa (> 10 ciclos/h de intercambios de aire) > Sala de presión neutra o una sala lateral simple.
- Interfaz CPAP, en orden de preferencia: Máscara facial completa > Casco CPAP > Máscara estándar (opción menos preferida).
- Plan establecido para intubación si es necesario.
- Utilizar filtros virales en todos los sistemas de escape.
- Asegurar uso del EPP y métodos para evitar inadvertidamente la desconexión del circuito.

Posicionamiento Prono en Pacientes NO Intubados

- Se puede realizar en pacientes no intubados.
- Parece reducir la cantidad de oxígeno necesaria, pero aún no es un tratamiento estándar.
- No requiere de equipo o entrenamiento especializado.
- Se puede combinar con el uso de cánula nasal de alto flujo y CPAP/BiPAP.
- Utilizarlo con cautela y monitoreo cuidadoso de los pacientes.

Posicionamiento Prono en Pacientes NO Intubados

- Aumenta oxigenación (PaO_2/SpO_2).
- Los pacientes reportan una mejoría de síntomas.
- Selección cuidadosa de pacientes que puedan proteger sus vías respiratorias.

Posicionamiento Prono Puede Mejorar la Oxigenación y Disminuir la Tasa Respiratoria

Posicionamiento Prono en Pacientes NO Intubados:

¿En Quiénes se Debe (o no) Utilizar?

- **Recomendación de la Sociedad de Cuidados Intensivos del Reino Unido, se debe considerar en pacientes con ≥ 2 L/min de oxígeno.**
- **Evitar en personas sin**
 - ✓ Problemas anticipados de la vía aérea.
 - ✓ Distrés respiratorio (>35 /min, uso de músculos accesorios, $\text{PaCO}_2 >48$ mmHg).
 - ✓ Inestabilidad hemodinámica (SBP <90 mmHg) o arritmias.
 - ✓ Agitación o estado mental alterado.
 - ✓ Cirugía abdominal reciente, inestabilidad de la espina o injuria torácica.

Posicionamiento Prono en Pacientes NO Intubados: ¿En Quienes se Debe (o no) Utilizar?

- **Contraindicaciones relativas:**
 - ✓ Injuria facial o úlceras.
 - ✓ Problemas neurológicos (ej. epilepsia).
 - ✓ Obesidad severa.
 - ✓ Embarazo en el segundo o tercer trimestre.
- **Titulación de SpO₂ (objetivo):**
 - ✓ 88-95% (si tiene monitoreo continuo).
 - ✓ 95-97% (en entornos donde la pulso oximetría continua no es disponible).

Posicionamiento Prono en Pacientes NO Intubados: Recomendaciones

- Asegurar que el tubo de oxígeno es suficiente largo para acomodar el posicionamiento prono.
- Almohadas para sostener el pecho.
- Posición de Trendelenburg reversa puede ayudar a la comodidad.
- Para facilitar posicionamiento prono no administrar sedativos o analgésicos.

Posicionamiento Prono en Pacientes NO Intubados: Recomendaciones

- Cambiar de posición cada 1-2 horas para mantener el mayor tiempo posible en posicionamiento prono.
- Cuando no esté en posicionamiento prono, intente sentarse entre 30-60 grados en posición vertical.
- Monitorear SpO₂ después de cada cambio de posición.
- Reducir la cantidad de oxígeno al objetivo según sea posible.

Posicionamiento Prono en Pacientes NO Intubados: Recomendaciones

- **Descontinuar si:**
 - ✓ No se observa mejoría con cambio de posición.
 - ✓ Paciente no tolera la posición.
 - ✓ RR $\geq$ 35 respiraciones/minuto, parece cansado, está usando músculos accesorios.
- **Escalar el cuidado del paciente cuando hay desaturaciones sin respuesta a un aumento de la cantidad de oxígeno.**

Posicionamiento Prono en Pacientes NO Intubados: ¿Por Cuánto Tiempo?

- No existe buena evidencia para guiar la duración del posicionamiento prono en pacientes no intubados.
- En pacientes intubados, la recomendación de posicionamiento prono es ~ 16 h/día.
- **Recomendación:** Mantener el posicionamiento prono lo más que sea posible.

Conclusión de Escenario Clínico Parte 2

COVID-19: Evolución. Día 3.

- Se inició terapia con O₂ en alto flujo:
 - ✓ Flujo pico: 60 lpm.
 - ✓ FiO₂: 90%.
- Posición en prono.
- Tratamiento antiinflamatorio, anticoagulantes...

COVID-19: Escenario Clínico. Día 3.

Examen físico:

37 C

Temperatura

20 X

Frecuencia
Respiratoria

120/70

Presión
Arterial

97%

SO₂,
FiO₂ 80%

85 X

Frecuencia
Cardiaca

COVID-19: Evolución. Día 7.

- Evolución favorable, con disminución progresiva de los requerimientos de O_2 .
- En las siguientes 72 horas, se coloca en sistema de flujo bajo de oxígeno manteniendo metas de oxigenación.
- Mejoría radiológica y disminución de marcadores inflamatorios.
- Es dado de alta a su domicilio a los 7 días.

**Recursos Disponibles sobre
terapia ventilatoria en pacientes
con la COVID-19**

1. Estimar la Oferta y Demanda de Oxígeno de las Instalaciones

SUMINISTRO Y DEMANDA DE O₂ SaO₂ a PaO₂ DURACIÓN DEL CILINDRO Language Español

Paso 1. Seleccione la fuente(s) de oxígeno (¿no está seguro?)

Seleccione la fuente más común de oxígeno en su unidad de salud
Cilindros de oxígeno

Paso 2. Ingrese el suministro total

Seleccione el tamaño de cilindro más frecuente en su centro (¿no está seguro?) Cilindro Tamaño H (1.5 metro; 6600L)

Ingrese la cantidad de cilindros de oxígeno disponibles 0

Paso 3. Ingrese las necesidades del paciente

ESTIMACIÓN PERSONALIZADA

Estimación por sala

Número máximo de pacientes por tipo de dispositivo

Estimación por sala

INGRESA EL NÚMERO DE PACIENTES Y TASA DE FLUJOS

50

Consumo diario (litros) 0

Suministro total (litros) 0

Duración del suministro Horas 0 días

2. Cuidados Críticos para el Médico No Intensivista

Society of Critical Care Medicine

The screenshot shows the Open Critical Care website interface. At the top left is the logo 'oc₂ Open Critical Care'. The navigation bar includes 'Home', 'About', 'Resources', and 'COVID19'. A yellow button labeled 'Ask an expert' is on the right, along with a language selector set to 'English'. The main content area features a red sidebar with the text 'ICU Respiratory Care for Non-ICU Physicians' and a circular Flowcode QR code. The main article title is 'Cuidados críticos para el médico no intensivista - SCCM' with a green checkmark icon and a 'Copy link' button. Below the title are breadcrumb links: 'COVID-19 | General Intensive Care | Health Worker Psychosocial Health | Infection Prevention Control | Respiratory Failure and Care > Monitoring and Diagnostics | Therapeutics | ARDS management | Mechanical Ventilation | Non-invasive oxygen delivery'. The article text states: 'La atención crítica de SCCM para el médico que no Intensivista trabajando en la UCI brinda educación en línea a todos los profesionales de la salud. Prepárate con este recurso gratuito.' Below the text is a link icon and the text 'Cuidados críticos para el médico no intensivista by SCCM'. A 'Español' button is located in the bottom right corner of the content area.

3. COVID 19 NEJM: Treatment simulator

Society of Critical Care Medicine

Covid-19 Rx: Treatment Simulations

You are a health care provider in a developed country. Several patients await your care. These patients are suspected of having Covid-19 and have been triaged by severity of illness. We recommend:

- Mild or Moderate case if unfamiliar with evaluation of Covid-19
- Severe case if interested in managing severe Covid-19 in an intensive care setting
- Critical and Expert cases if interested in managing severe Covid-19 and its complications in an intensive care setting

Mild

Mary Kuri is a young woman who arrives to the emergency room with fever and cough. Although she may have a mild illness, ruling out Covid-19 and evaluating for disease severity is important.

Moderate

Although the majority of patients with viral respiratory illnesses recover spontaneously, some patients can deteriorate. Indeed, Mary Kuri returns and now feels short of breath.

4. Referencia de Bolsillo para la Atención Respiratoria

Referencia de Bolsillo para Atención Respiratoria v1.16

Escanéame

Fuentes de oxígeno y Dispositivos para su administración

Cánula nasal (NC)	<p>Pros: Universal; comúnmente utilizada hasta 6LPM</p> <p>Contras: Requiere humidificación si >4LPM (riesgo de epistaxis); no proporciona apoyo para el trabajo respiratorio</p> <p>O₂: trabaja con cualquier fuente de presión vía un medidor de flujo; FIO₂ aumenta 2-4% por LPM; cantidad de FIO₂ administrada se basa en la ventilación minuto y la tasa de flujo del paciente</p>
Máscara con bolsa reservorio/ Máscara facial sin bolsa reservorio (MRB/MF)	<p>Pros: >~Alto FIO₂; puede ser más cómoda que NC</p> <p>Contras: >FIO₂ limitada si hay un esfuerzo respiratorio elevado; no proporciona apoyo para el trabajo respiratorio</p> <p>O₂: trabaja con cualquier fuente de presión vía el medidor de flujo; una simple FM 5-10 LPM (~FIO₂ 35-50%); MBR 10-15 LPM (~FIO₂ 60-80%); suficiente flujo para prevenir un colapso de la bolsa reservorio</p>
Cánula nasal de alto flujo (HFNC)	<p>Pros: Puede lograr una alta FIO₂ incluso con una ventilación minuto alta; puede titular el flujo y la FIO₂; para mayor comodidad debe ser calentado y humidificado; puede mejorar los resultados en fallas respiratorias hipoxémicas agudas comparados con la ventilación no invasiva (NIPPV) o la oxigenoterapia de bajo flujo; una pequeña cantidad de presión positiva apoya el trabajo respiratorio</p> <p>Contras: Requiere un dispositivo especial; consume grandes cantidades de oxígeno</p> <p>O₂: Requiere una fuente alta de flujo (presión > 20cmH₂O; FIO₂ ajustable con la</p>

Mecánica respiratoria

Presión positiva al final de la espiración (PEEP)	<ul style="list-style-type: none"> Presión dentro del circuito respiratorio al final de la exhalación Debe ser ≥ 5 cmH₂O en IMV para prevenir el desreclutamiento de los alvéolos Este valor siempre lo establece el operador del ventilador
Presión (PIP) <small>Inspiratoria Pico</small>	<ul style="list-style-type: none"> Refleja la presión generada por las vías aéreas/resistencia y complianza del tubo endotraqueal TET Rango 10-40cmH₂O; objetivo <40cmH₂O
Presión (Pplat) <small>Plateau</small>	<ul style="list-style-type: none"> Refleja únicamente la presión en los alvéolos Si es en modo controlado por volumen, realizar pausa inspiratoria (cuando no hay flujo, no hay resistencia; Pplat = P en los alvéolos) Objetivo <30cmH₂O (adultos);
Presión (Pdr) <small>de distensión</small>	<ul style="list-style-type: none"> Refleja únicamente la presión de distensión Si es en control de volumen, realizar pausa inspiratoria (cuando no hay flujo, no hay efecto de resistencia) Objetivo ≤ 15cmH₂O; riesgo de volutrauma
Relación I:E	<ul style="list-style-type: none"> I:E = ratio de la Inspiración to Expiración Normal 1:2 o 1:3; 1:1 sólo es típicamente indicado; 1:4 o 1:5 p
Ventilación al minuto (MV)	<ul style="list-style-type: none"> $MV = V_T \times TR$; en donde V_T es el volumen de respiración y TR es la tasa respiratoria Normal 4-6 LPM; ~más bajo si el paciente está sedado; ~más alto 8-14 LPM en el paciente no sedado Ajustar para una meta pCO₂ (por ejemplo, ~6-8 L/min en la mayoría de adultos con ARDS)
Flujo Pico	<ul style="list-style-type: none"> El flujo más alto entregado por el ventilador

Escanéame

5. Tablero de Lineamientos Sobre la COVID-19

Open Critical Care

Home About Resources COVID19 Ask an expert English

LAST UPDATED JANUARY 31, 2021

COVID-19 Guidelines Dashboard

BY COLLABORATORS FROM:

NEJM GROUP UCSF COVID protocols.org

This resource aggregates guidelines for COVID-19 care from leading global health authorities and consolidates them into a single recommendation based on concordance. More institutions coming soon.

Categorizations of recommendations are generated as outlined below and do not necessarily reflect the views of UCSF, NEJM Group, or other institutions on this Dashboard.

Filter by topic

Management of hypoxemia Personal Protective Equipment Therapeutics in COVID-19

Filter by level of evidence (Beta)

A B C

Open Critical Care

Home About Resources COVID19 Ask an expert English

Next Live Chat :: February 5, 12:00 - 14:00 UTC -5

Legend

Recommended Not Recommended Not recommended unless in clinical trial No recommendation or Uncertain

Do Inconclusive Don't

Systemic Corticosteroids

Guidelines and available data recommend the use of dexamethasone or an alternative...

Show more

Administration of Systemic Corticosteroids in Patients With COVID-19 (JAMA Sept 2020)

WHO CDC SCCM ESICM IDSA NIH UCSF BWH

Intermediate Dosing of DVT/VTE Prophylaxis in Critically Ill Patients

Given concerns for hypercoagulability in critically ill patients with COVID-19, some...

Show more

Association of Treatment Dose Anticoagulation With In-Hospital Survival Among Hospitalized Patients With COVID-19 (JACC)

Baricitinib (JAK inhibitor)

There are inadequate data to recommend routine use of the anti-JAK1/JAK2 drug baricitinib in...

Show more

Baricitinib plus Remdesivir for Hospitalized Adults with Covid-19 (NEJM Dec 2020)

Recently moved from Inconclusive

WHO CDC SCCM ESICM IDSA NIH UCSF BWH

<https://opencriticalcare.org/covid-dashboard/>

Preguntas y Respuestas

RED DE APRENDIZAJE

Para la Respuesta a la COVID-19 en América Latina

Guías Prácticas para la Ventilación Mecánica en Pacientes Diagnosticados con Neumonía por COVID-19

Miércoles, 17 de Febrero, 2021

8pm (Washington D.C.) | 7pm (Honduras) | 9pm (Paraguay)

USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

EpiC Meeting Targets and
Maintaining Epidemic Control

HP+
HEALTH POLICY PLUS
Better Policy for Better Health

Post-Test

- Por favor escanee el código o utilice el enlace a mano derecha para contestar el post-test. Este código y enlace también serán enviados por correo electrónico mañana (adjunto con el certificado de asistencia y grabación de la presentación de hoy)
 - Tomara de 3-5 minutos

<https://bit.ly/3j8mey3>

¡Gracias por tu Dedicación y Esfuerzo Salvando Vidas!

USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA